

Defesa:20/12/2001

## **ESTUDO DO EXERCÍCIO DE VIBRAÇÃO SONORIZADA DE LÍNGUA NAS LARINGECTOMIAS FRONTO LATERAIS**

**Márcia Regina Chagas Rodrigues**

Leslie Piccolotto Ferreira (Orientadora)

[http://aleph50018.pucsp.br/F/8VF4I217DPGUKNCBPYUCPKLD6RRFHGYB6LVP99ULK8J8TJVAM-15252?func=item-global&doc\\_library=PSP01&doc\\_number=000144648&year=&volume=&sub\\_library=BNGK](http://aleph50018.pucsp.br/F/8VF4I217DPGUKNCBPYUCPKLD6RRFHGYB6LVP99ULK8J8TJVAM-15252?func=item-global&doc_library=PSP01&doc_number=000144648&year=&volume=&sub_library=BNGK)

A vibração contínua de língua com sonoridade glótica, representa um exercício usado com grande freqüência no tratamento vocal. A execução de uma vibração de língua gera uma série de mudanças fisiológicas, com representações vocais facilmente observáveis. O exercício de vibração sonorizada de língua, utilizado na prática clínica diária e realizado por sujeitos que apresentam vozes alteradas ou sem queixa vocal, tem como principal objetivo realizar ajustes motores que propiciem maior equilíbrio entre as forças aéreo dinâmicas pulmonares e mioelástica da laringe. Sua eficácia é comprovada na reabsorção das lesões de pregas vocais, na redução da hiperfunção da laringe e para o aquecimento e desaquecimento vocal. Para análise dos efeitos do exercício de vibração sonorizada de língua, nas laringectomias fronto lateral com reconstrução de Bayle, participaram de nosso estudo cinco sujeitos, todos do sexo masculino, com idade entre 59 e 61 anos, apresentando distúrbios vocais decorrentes da ressecção de estruturas da fonte sonora. A análise dos dados incluiu uma avaliação da qualidade vocal por meio da análise perceptivo auditiva e uma avaliação laringológica da configuração da laringe, nas seqüências pré e pós vibração sonorizada de língua.